

# بیست و یکمین کنگره بیماری‌های عفونی و گرمسیری ایران

۳۰ دی ماه لغایت ۴ بهمن ماه ۱۳۹۱

21<sup>th</sup> IRANIAN CONGRESS  
ON INFECTIOUS DISEASES  
AND TROPICAL MEDICINE

Jan 19-23 2013

## برگزارکننده

انجمن متخصصین بیماری‌های عفونی و گرمسیری ایران  
مرکز مدیریت بیماری‌ها، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  
انجمن حمایت از بیماران عفونی کشور

## با همکاری

مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی سل و بیماری‌های ریوی  
بخش تحقیقات بالینی انسیتو پاستور ایران  
مرکز تحقیقات ایدز دانشگاه علوم پزشکی تهران  
مرکز تحقیقات عفونی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

## محل برگزاری کنگره

تهران، خیابان شهید باهنر (نیاوران)، خیابان شهید آقایی  
سازمان ایرانی مجامع بین‌المللی ICIC

## دیرخانه کنگره

تهران، نیاوران، دارآباد، بیمارستان مسیح دانشوری  
تلفکس: ۰۲۱-۲۶۱۰۵۳۵۰ ، تلفن: ۰۲۱-۲۷۱۲۲۱۷۲

## Website

WWW.IICCOM.ORG

## E-mail

IICCOM@IICCOM.ORG



مرکز تحقیقات ایدز  
دانشگاه علوم پزشکی تهران



P113

روند تغییرات شاخصهای برنامه کشوری سل در استان اردبیل از سال ۱۳۸۳ لغایت ۱۳۸۹

دکتر منوچهر براک<sup>۱</sup>، دکتر آرزو معینی<sup>۲</sup>، داریوش امدادی<sup>۳</sup>، سیده نگار مدرس صدرانی<sup>۴</sup>

۱. عضو هیئت علمی و فوق تخصص عفونی اطفال (دانشیار) و معاون بهداشتی دانشگاه، ۲. پزشک هماهنگ کننده سل استان، ۳.

کارشناس مسئول بیماریهای واگیر استان، ۴. کارشناس مسئول آزمایشگاه استان

**مقدمه و هدف:** سل یک بیماری عفونی است که در حال حاضر به بیماری فقر اقتصادی در جامعه معروف شده است. تشخیص بیماران سل ریوی اسمیر مثبت بعنوان محور اصلی برنامه مبارزه با سل بوده و شناسایی و درمان این بیماران ضروری است. بیماری سل در رتبه های بالای بار بیماری بر اساس DALY بوده و پیش بینی می شود تا سال ۲۰۲۰ همچنان جایگاه بالای خود را حفظ کند.

**روش کار:** در این مطالعه توصیفی مقطعی اطلاعات مربوط به شاخص های اجرای برنامه کشوری سل در استان اردبیل از پرونده بیماران مسلول و فرم های کامپیوتری استخراج و با روش های آمار توصیفی به صورت تعداد و درصد آنالیز شدند.

**نتایج:** متوسط میزان بیماریابی موارد جدید سل ریوی اسمیر مثبت در سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۹ برابر ۴۰.۸٪ بود. متوسط درصد موفقیت درمان بیماران مسلول طی سالهای ۱۳۸۳ لغایت ۱۳۸۸ برابر ۹۳/۳٪ بوده است. بیشترین درصد موفقیت در سال ۱۳۸۴ با ۹۹.۹۹٪ بود. میزان بروز سل ریوی اسمیر مثبت از ۵.۷ در سال ۱۳۸۳ به ۴ نفر در هر ۱۰۰۰۰۰ جمعیت در سال ۱۳۸۹ رسیده است. متوسط میزان بهبودی از بیماری سل طی سالهای ۱۳۸۳ لغایت ۱۳۸۸ برابر ۸۹.۶٪ که بیشترین درصد با ۹۸.۳٪ مربوط به سال ۱۳۸۴ بوده است. متوسط میزان بروز کلی بیماری سل طی سالهای ۱۳۸۴ - ۱۳۸۹ برابر ۱۰ در هر ۱۰۰۰۰۰ نفر جمعیت بوده است.

**نتیجه گیری:** نتایج نشان داد که در بعضی از شاخصهادر مقایسه با استانداردهای کشوری و جهانی هنوز فاصله داریم و ضروری است که با شناسایی نقاط ضعف عملکرد برنامه در خصوص ارتقاء سیستم هاو بیماریابی از تمام توان سیستم بهداشتی استفاده کرده و آموزش همگانی لازم را برای بیماران و افراد جامعه ارایه دهیم.

**کلمات کلیدی:** سل، شاخص، درصد موفقیت، اپیدمیولوژی، اردبیل